



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL NAȚIONAL de SUPRAVEGHERE și CONTROL AL BOLILOR TRANSMISIBILE
Tel.: (+40 21) 317 9702 Fax: (+40 21) 318 3634 ; E-mail: cnscbt@insp.gov.ro

Nr.12568 din 09.09.2015

Catre

Directiile de Sanatate Publica Judetene si a Mun.Bucuresti
In atentia Doamnei/Domnului Director Adj.Sanatate Publica si a Medicului Sef al
Serviciului/Compartimentului de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

CC: Centrele Regionale de Sanatate Publica Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara
Institutul National de Pneumologie "Marius Nasta"

Stimati colegi,

Va trimitem, anexata la prezenta adresa, **Scrisoarea metodologica privind vaccinarea BCG, citirea cicatricii vaccinale BCG si recuperarea restantierilor.**

Va rugam sa o aduceti la cunostinta tuturor medicilor de familie, a spitalelor/sectiilor de Obstetrica-Ginecologie si Pediatrie, a coordonatorului judetean al Programului National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei (PNPSCT) si a dispensarelor de pneumoftiziologie din teritoriul dumneavoastra.

Cu stima,

Director General

Dr.Alexandra CUCU



Director CNSCBT,

Dr.Adriana PISTOL

Red.,int.
Dr.Odette Popovici

Institutul National de Sanatate Publica
Centrul National de Supraveghere
si Control al Bolilor Transmisibile

Nr. 12.568 din 09.09.2015

Institutul de Pneumologie
"Marius Nasta"

Nr. 342 din 08.09.2015

**Scrisoare metodologica privind vaccinarea BCG,
citirea cicatricii vaccinale BCG si recuperarea restantierilor**

- 1. Vaccinarea BCG** se face la nou-nascut in maternitate, la varsta de 2-7 zile si este asigurata gratuit, in cadrul Programului National de Vaccinare (PNV).
Persoanele simptomatice sau asimptomatice infectate cu HIV nu vor fi imunizate cu vaccinul BCG.
- 2. Citirea cicatricii vaccinale BCG** se face la varsta de **6 luni**, in cabinetul medicului de familie.
- 3. Maternitatile / medicii din dispensarele de pneumoftiziologie** asigura recuperarea la vaccinarea BCG:
 - a copiilor in varsta de **6 luni**, cu cicatrice vaccinale BCG de 0-2 mm inclusiv, testati IDR la tuberculina si avand rezultat negativ (0-9 mm pentru copiii fara infectie HIV) la aceasta testare;
 - in timp cat mai scurt, dar nu mai tarziu de varsta de **1 an**, a copiilor nevaccinati la nastere, testati IDR la tuberculina daca au depasit varsta de **3 luni** si avand rezultat negativ la aceasta testare;
 - a copiilor sositii din strainatate nevaccinati, pana la varsta de **4 ani**, copii cu rezultat negativ la testarea IDR la tuberculina.

Directia de Sanatate Publica Judeteana / a Mun. Bucuresti decide efectuarea recuperării la vaccinarea BCG in maternitate sau in cadrul dispensarului de pneumoftiziologie.

In cazul in care DSP opteaza pentru **maternitate**, recuperarea la vaccinarea BCG se va face in **spatii special destinate** acestei activitati, din cele destinate **Serviciului primire/UPU/CPU Pediatrie** sau cu **separarea circuitelor in timp** in cadrul acestui serviciu. Testarea prin IDR la tuberculina la copiii in varsta de peste 3 luni va fi asigurata, in aceste spatii, de catre personalul Sectiei de Pediatrie, iar recuperarea la vaccinarea BCG, de catre personalul Sectiei Neonatologie.

In cazul in care, la chestionarea parintilor/apartinatorilor privind existenta unui caz de tuberculoza in familie, raspunsul este pozitiv, copilul va fi indrumat, pentru evaluare, la dispensarul de pneumoftiziologie.

In cazul in care DSP opteaza pentru **dispensarul de pneumoftiziologie**, testarea IDR la copii in varsta de peste 3 luni si recuperarea la vaccinarea BCG se vor face in **spatii special destinate acestei activitati sau cu separarea circuitelor in timp**.

Legislatie si documentatie aferenta:

- In **Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 386/2015** privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sanatate publica pentru anii 2015 și 2016, I. PROGRAMELE NAȚIONALE DE BOLI TRANSMISIBILE, I.1.PROGRAMUL NAȚIONAL DE VACCINARE, se mentioneaza urmatoarele:

(...)

1.2 Activități derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere si control al bolilor transmisibile din DSP:

1.2.15. incheierea contractelor cu spitalul in structura caruia functioneaza dispensarul teritorial de pneumoftiziologie pentru asigurarea vaccinului BCG necesar recuperarii la vaccinare, in cazul in care DSP decide efectuarea recuperarii la BCG in aceste dispensare;

(...)

1.3 Activitati desfasurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul maternitatilor, din sistemul public si privat

1.3.1. estimarea cantitatilor de vaccinuri BCG (...) necesare si transmiterea acestora catre DSP;

1.3.3. depistarea, inregistrarea si notificarea DSP cu privire la reactiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei

1.3.5. informarea parintilor cu privire la vaccinarile si calendarul de efectuare a acestora;

1.3.6. inregistrarea corecta si la timp a vaccinarilor efectuate, in evidentele medicale si in RENV, precum si consemnarea vaccinarilor efectuate in biletul de externare si in carnetul de vaccinari al nou-nascutului.

(...)

1.3.8. raporteaza la DSP vaccinarile efectuate, detaliat pe fiecare tip de vaccin

„1.5. Activități desfășurate de furnizorii de servicii spitalicești care au în structură dispensare de pneumoftiziologie:

1.5.1. administrarea de vaccin BCG în vederea recuperării, în cazul în care DSP decide efectuarea recuperării la vaccinarea BCG în cadrul acestor dispensare;

1.5.2. informarea medicului de familie al copilului despre vaccinarea BCG efectuată prin scrisoare medicală;

1.5.3. înregistrarea corectă a vaccinărilor efectuate în evidențele medicale și în Carnetul de vaccinare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinare, cu modificările și completările ulterioare;

1.5.4. depistarea, înregistrarea și notificarea direcției de sanatare publica judetene/ a municipiului Bucuresti cu privire la reactiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei

1.5.6. raportarea vaccinarilor la DSP

(...)

- **Recomandari OMS privind vaccinarea BCG a sugarilor aflatii la risc pentru infectia HIV**

OMS a recomandat pana in urma cu cativa ani ca in tarile cu "povara" mare (n.tr.: a se citi prevalenta mare) prin tuberculoza sa se administreze o singura doza de vaccin BCG tuturor sugarilor sanatosi, cat mai curand posibil dupa nastere, cu exceptia copiilor cu infectie HIV *simptomica*.

Totusi, evidente recente arata ca acei copii care erau infectati HIV la momentul vaccinarii BCG si care au dezvoltat ulterior Boala SIDA, au fost la risc crescut de a dezvolta o infectie TB diseminata din cauza vaccinului BCG. Pentru acesti copii, beneficiul prevenirii formelor severe de TB este depasit de riscul asociat vaccinarii (n.tr.: a se citi RAPI - Infectie BCG diseminata).

Prin urmare, Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) a sfatuit OMS sa modifice recomandarea anterioara, astfel:

Copiii cunoscuti ca infectati cu HIV, chiar asimptomatici, NU trebuie vaccinati BCG.

Sursa: OMS – WER, NO.21, 25 MAY 2007

http://www.who.int/immunization/wer8221bcg_May07_position_paper.pdf

- Producatorul de vaccin BCG utilizat in prezent in Romania, BB-NCIPD Ltd. Bulgaria, mentioneaza in prospectul acestuia

„Contraindicatii si precautii

(...) Persoanele *simptomatice sau asimptomatice* infectate cu HIV nu vor fi imunizate cu vaccinul BCG.”

Coordonatori tehnici

I.4. Programul National de prevenire, supraveghere si control al tuberculozei

Dr. Gilda Popescu - INP „Marius Nasta”

Dr. Odette Popovici - INSP – CNSCBT



I.1. Programul National de Vaccinare

Dr. Aurora Stanescu - INSP - CNSCBT

Dr. Rodica Popescu - INSP - CNSCBT

Two handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names of Dr. Aurora Stanescu and Dr. Rodica Popescu.