



Direcția de Sănătate Publică a  
Județului Cluj



Societatea Română de  
Cancer

## Ziua Mondială fără Tutun – 31 Mai 2013

### COMUNICAT DE PRESĂ

#### **Fumatul reprezintă principala cauză evitabilă de deces la nivel mondial!**

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a proclamat în anul 1987 ziua de 31 mai ca fiind "Ziua Mondială fără Tutun" pentru a atrage atenția asupra riscurilor de sănătate asociate consumului de tutun.

#### **In 2013 OMS a lansat apelul:**

**„Să interzicem publicitatea, promovarea și sponsorizarea în favoarea produselor de tutun”.**

Tutunul ucide aproape jumătate din utilizatorii săi: numărul deceselor cauzate de tutun a fost de 100 de milioane în secolul 20. Dacă tendințele actuale continuă, se va ajunge până la un miliard de decese în secolul 21. Fumatul este responsabil pentru aproximativ 6 milioane decese în fiecare an, din care peste 5 milioane sunt fumători, iar peste 600.000 nefumători expuși fumatului pasiv.

11.000 decese asociate fumatului în fiecare zi!

Fumatul este incriminat în apariția cancerului pulmonar, dar și a altor tipuri de cancere (bucal, laringian, faringian, stomac, esofag, pancreas, vezică urinară, rinichi, s.a). În afară de maladii neoplazice, tutunul are rol în apariția unor afecțiuni cardiace (ex. cardiopatia ischemică și infarctul miocardic), accidente vasculare cerebrale și afecțiuni respiratorii cronice.

În România se estimează că aproape 1 din 4 decese considerate a fi premature în rândul celor cu vârsta 30 - 44 și 1 din 3 decese din grupul de vârstă 45 - 59 de ani se datorează fumatului.

În județul Cluj, numărul bolnavilor aflați în evidență cu afecțiuni pulmonare cronice obstructive a crescut de la 12.501 cazuri (în 2011) la 13.176 (în 2012), iar în cazul bolnavilor cu cardiopatii ischemice de la 41.460 (în 2011) la 42.017 (în 2012). Datele Registrului Regional de Cancer NV indică creșterea cu 34% a ratei brute a incidenței cancerului bronhopulmonar la sexul masculin, între anul 2000 și 2008, de la 66,86 la 89,8/100.000 bărbați, iar la sexul feminin cu 60% de la 11,77 la 18,89/100.000 femei, de asemenea crescând și rata brută a mortalității, prin la cancer bronhopulmonar la bărbați, între 2000-2008, cu 25,3%, de la 67,57 la 84,67/100.000 bărbați, iar la femei cu 42% de la 12,85 la 18,33/100.000 femei. De asemenea datele Registrului Regional de Cancer NV indică și creșterea accentuată a tuturor formelor de cancer asociate fumatului, mai ales în rândul femeilor.

**"Interzicerea publicității, promovării și sponsorizării tutunului este una din cele mai bune căi de a proteja tinerii de a începe să fumeze dar și de a reduce consumul de tutun la nivelul întregii populații"** consideră Douglas Bettcher, Director OMS al diviziei de prevenire a bolilor netransmisibile.

**Dr. Dorina Duma**  
Director Executiv  
Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj

**Dr. Adriana Melnic**  
Director Executiv  
Societatea Română de Cancer